

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,
RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA**

**BOLLETTINO DI PRODUZIONE INTEGRATA ACTINIDIA
n° 12 del 28 agosto 2026**

PREVISIONI METEOROLOGICHE

Il mese di agosto è stato caratterizzato da temperature elevate sia nei valori massimi che minimi, con un cambiamento dello scenario che si è verificato solamente intorno al 20 agosto. Nel fine settimana un veloce fronte potrà incrementare l'instabilità atmosferica.

Le previsioni meteorologiche dell'OSMER sono consultabili sul sito www.osmer.fvg.it

Per maggiori informazioni su dati meteorologici puntuali consultare il sito Ersà al link <http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/sezione-meteo/mappa-stazioni-meteo/>

FENOLOGIA (rilievi 35^settimana: dal 24 agosto al 30 agosto 2026)



Le piante di *Actinidia deliciosa* – cv. HAYWARD sono in fase di accrescimento dei frutti (80% della grandezza finale).



Le piante di *Actinidia chinensis* - SORELI si trovano in fase di accrescimento dei frutti (90% della grandezza finale).



Le varietà di *Actinidia chinensis* – RED e GOLD PASSION, si trovano in fase di accrescimento dei frutti (90% della grandezza finale).

La tabella completa con le fasi fenologiche BBCH per actinidia è scaricabile al link:

http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/difesa-integrata-obbligatoria/bollettini-fitosanitari/actinidia/fasi-fenologiche-actinidia/FASI%20FENOLOGICHE_BBCH%20ACTINIDIA.pdf

SITUAZIONE FITOSANITARIA E STRATEGIE DI DIFESA

RILIEVI IN FRUTTETO	STRATEGIA
CANCRO BATTERICO DELL'ACTINIDIA <i>(Pseudomonas syringae pv. Actinidiae – PSA)</i>	In questa fase fenologica non si prevedono interventi specifici contro questo patogeno tuttavia in caso di precipitazioni impetuose abbinate a forte vento o eventi grandinigeni è opportuno intervenire con formulati a base di rame o propoli con effetto batteriostatico e cicatrizzante.
Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>): • Il caldo di agosto sembra aver ostacolato la presenza di adulti nei frutteti tuttavia negli ultimi giorni con l'abbassamento delle temperature ed il ritorno delle piogge la presenza di adulti nei frutteti è aumentata e si sono riscontrate anche ovature e forme giovanili • Prestare attenzione per non confondere le ovature di cimice asiatica con quelle di cimice verde (vedi foto di seguito riportate).	• Valutare attentamente l'incremento di popolazione del fitofago nel proprio frutteto eventualmente confrontandosi con il tecnico di riferimento. • Nella valutazione dell'intervento insetticida occorre tener conto di quanto già effettuato e del numero complessivo di interventi indicato nel Disciplinare di produzione integrata.



Femmina di *H. halys* in fase di ovideposizione



Ovatura di *Nezara viridula* (cimice verde)



Ovatura di cimice asiatica



Ovatura parassitizzata di cimice asiatica

INDICAZIONI AGRONOMICHE

IRRIGAZIONE • In questo periodo il fabbisogno giornaliero è diminuito rispetto agli altri mesi estivi per effetto della riduzione delle ore di luce giornaliere. • Per valutare correttamente il volume irriguo, oltre a tener conto delle caratteristiche dell'impianto e del fabbisogno irriguo giornaliero della coltura è utile l'impiego di sonde igrometriche e tensiometri per valutare più precisamente l'umidità del suolo (almeno nei primi 30-40 cm).	Nel mese di settembre, il valore di restituzione idrica (millimetri/giorno: quantità d'acqua necessaria giornalmente per uno sviluppo ottimale della pianta) per impianti in produzione è il seguente: • 3,5 mm al giorno con interfilare inerbito • 3,0 mm al giorno con interfilare lavorato
CONCIMAZIONE • In questa fase gli interventi di concimazione sono finalizzati al miglioramento della qualità e pezzatura della frutta ed alla maturazione dei tralci utili per la prossima stagione. • Pertanto sono preferibili formulati a pronto effetto quali concimazioni liquide al terreno o concimazioni fogliari. • Gli apporti di elementi nutritivi distribuiti con le concimazioni devono rispettare le indicazioni contenute nel Disciplinare di produzione integrata per coloro che operano in sistemi di certificazione volontaria. • Le concimazioni fogliari devono essere riportate nel quaderno di campagna.	• Nelle concimazioni liquide al terreno, per impianti in produzione, si consiglia l'impiego di solfato di potassio, eventualmente abbinato ad acidi umici. • Similmente, si consiglia l'impiego di formulati contenenti potassio per interventi fogliari. • Per migliorare l'efficacia delle concimazioni fogliari può essere utile l'impiego di alghe ad azione biostimolante e/o corroborante.

TRATTAMENTI CON FIORITURE PRESENTI

Si ricorda inoltre che, indipendentemente dalla fase fenologica della coltura, **prima dell'effettuazione di ogni intervento con prodotti insetticidi, acaricidi e diserbanti** o altri prodotti tossici per le api, è **obbligatorio** procedere con lo **sfalcio delle erbe in fiore** presenti nell'appezzamento oggetto di intervento, al fine di evitare danni a tutti gli insetti impollinatori presenti in campo.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI E DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI. PER LE AZIENDE CHE SEGUONO IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA (LIVELLO VOLONTARIO) SI RICORDA CHE I TRATTAMENTI VANNO ESEGUITI TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE NOTE E LIMITAZIONI D'USO DELLE NORME TECNICHE PER LA DIFESA FITOSANITARIA ED IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI.

CANALI TELEGRAM

A partire dal 2020, ERSa ha attivato un nuovo servizio gratuito che permette a tutti gli utenti che lo desiderino di ricevere, tramite l'applicazione **Telegram** scaricata su PC, tablet o smartphone, la notifica di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale www.ersa.fvg.it dei bollettini di difesa integrata per le colture di proprio interesse. Per **l'actinidia** il canale dedicato è il seguente:



Iscriviti al nostro canale Telegram ERSa FVG Bollettini actinidia integrato
Per iscriverti clicca qui: https://t.me/ERSA_actindia_IPM