

FAGIOLO RAMPICANTE CANOPO (ex 460 E1) Cod. SIAN 4216

Risultati medi di più anni e più località in Friuli Venezia Giulia a confronto con una cultivar di riferimento

RILIEVI VEGETATIVI								
Cultivar	Epoca fioritura	Colore screziatura baccello	Colore screziatura seme	Intensità screziatura baccello (5 Max)	Contemporaneità invaiatura (5 max)	Posizione sulla pianta dei baccelli	Vigoria pianta	Valutazione generale pianta all'invaiatura
CANOPO (ex 460 E1)	(+6 gg)	rosso su fondo giallo chiaro	rosso scuro su fondo bianco	5,0	4	medio-alta	medio-alta	5
BINGO		rosso su fondo giallo chiaro	rosso su fondo bianco	2,5	3	medio-alta	media	3

RILIEVI PRODUTTIVI											
Cultivar	Lunghezza baccelli invaiati (cm)	Indice curvatura* baccello invaiato (cm)	Indice curvatura* baccello secco (cm)	N° medio semi per baccello	Peso seme (g) all'invaiatura	Peso seme (g) secco	Resa sgusciatura** all' invaiatura %	Resa sgusciatura** su secco %	Dimensioni seme secco (lung, larg, spess) (mm)	Epoca invaiatura baccello	Epoca maturazione secca
CANOPO (ex 460 E1)	18	0,7	1,26	6,3	1,4	0,7	52	79	21.8; 9.1; 10.8	(+6 gg)	(+7 gg)
BINGO	16	0,7	1,21	6,1	1,5	0,7	57	73	20.8; 10.1; 11.7		

RILIEVI FITOPATOLOGICI					
Cultivar	Piante colpite in campo da BCMV (%)	Sanità baccello all'invaiatura (max 5)	Sanità seme all'invaiatura (max 5)	Sanità baccello a maturazione secca (max 5)	Sanità seme a maturazione secca (max 5)
CANOPO (ex 460 E1)	0	4,5	5	3,75	4
BINGO	0	3	5	3	3

CARATTERISTICHE CULINARIE					
Cultivar	Incremento peso all'imbibizione (%)	Incidenza (%) tegumento nel seme imbibito	Resistenza seme a schiacciamento a cottura ultimata(N/m²)	Tempo medio di cottura (minuti)	Imbrunimento seme cotto (5 max)
CANOPO (ex 460 E1)	106	9,6	44	35	3
BINGO	102	10	53	44	4

- LEGENDA
- Intensità screziatura baccello all'invaiatura:** 1: scarso; 5 ottima
- Contemporaneità invaiatura:** (1 scarsa; 5 elevata)
- Valutazione pianta all'invaiatura:** (1 scadente; 5 ottima)
- Epoca fioritura:** (+/- giorni rispetto al testimone BINGO)
- Epoca invaiatura:** (+/- giorni rispetto al testimone BINGO)
- Epoca maturazione secca:** (+/- giorni rispetto al testimone BINGO)
- Sanità baccello** (0 scarsa, 5 ottima)
- Sanità seme** (0 scarsa, 5 ottima)
- Resa alla sgusciatura:** ((peso seme/(peso seme + baccello))x100
- Imbrunimento seme alla cottura:** 0 = nullo; 2,5 medio; 5 elevato
- Indice di curvatura (*):** il valore (in cm) è la misura dello scostamento

dalla verticalità del baccello tratto (a-b).
Al diminuire del valore si
riduce la curvatura



