


PRINCIPALI MISURE FITOSANITARIE OBBLIGATORIE NELLA ZONA INFESTATA

- Non spostare piante ospiti e loro parti (es. residui di potature) al di fuori dell'area infestata;
- Eseguire potature mirate per eliminare le parti di piante interessate da infestazioni dell'insetto;
- Estirpare le piante ospiti irrimediabilmente colpite;
- Eseguire trattamenti fitosanitari mirati con l'impiego di formulati autorizzati;
- Distruggere e smaltire i materiali vegetali infestati secondo le procedure che verranno fornite dal Servizio fitosanitario regionale.



MAPPA AREA DELIMITATA



In caso di dubbi sulla possibile presenza dell'insetto in ambito urbano, rivolgersi al Servizio fitosanitario regionale:



segnalazioni.fitosanitarie@ersa.fvg.it



Via Sabbatini, 5 Pozzuolo del Friuli (UD)
33050 - ERSa

ersa



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale



INFESTAZIONE DI ALEUROCANTHUS SPINIFERUS (QUAINTANCE) A CORMONS (GO)

COME RICONOSCERLO E
COMBATTERLO

ALEUROCANTHUS SPINIFERUS (QUAINTANCE)

ALEURODIDE SPINOSO (*Aleurocanthus spiniferus*) è un insetto invasivo appartenente alla famiglia degli Aleurodidi (comunemente noti come mosche bianche).

Ha origini tropicali ed è diffuso in Asia, Africa e nell'area del Pacifico.

In Italia è stato segnalato per la prima volta nel 2008 in Puglia, in provincia di Lecce.

Per la sua pericolosità *Aleurocanthus spiniferus* è inserito nell'elenco A2 dell'EPPO ed è organismo nocivo da quarantena per il territorio della Comunità Europea (Reg. UE. 2019/2072).

ELENCO DELLE PRINCIPALI SPECIE OSPITI:

Agrumi, kumquat, arancio trifoliato, caco, fico, edera, magnolia, alloro, melo, pero, nespolo, vite americana, pesco, ciliegio, albicocco, melograno, piracanta, rose e vite.

Nelle nostre zone ha mostrato, inizialmente, una spiccata preferenza per le piante del genere *Citrus* spp. (arancio, mandarino, limone) sia coltivate come piante da frutto sia come ornamentali.

CARATTERISTICHE INSETTO



- di colorazione grigia con macchie bianche di dimensioni molto ridotte, circa 1,5-1,7 millimetri;
- dal volo può essere confuso con una minuscola "farfallina"
- gli stadi giovanili non sono particolarmente mobili e hanno una colorazione scura con un cerchio ceroso bianco all'esterno;
- sono caratterizzati da piccole spine.
- in fase di alimentazione produce melata che causa la formazione di fumaggini su frutti e foglie.
- non presenta problematiche sanitarie né per l'uomo, né per gli animali.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI
CONSULTARE IL SEGUENTE LINK:**

WWW.ERSA.FVG.IT

ZONE INTERESSATE E AZIONI PREVISTE

La specie è stata segnalata a Cormons nel luglio 2025. Il Servizio Fitosanitario ha subito delimitato la zona infestata e la zona cuscinetto (successivamente aggiornate col Decreto n.133 del 20 febbraio 2026), adottando misure speciali di eradicazione (Decreto 397 del 05 agosto 2025).

La zona infestata riguarda solo il comune di Cormons, mentre la zona cuscinetto comprende anche parti di Capriva, Dolegna del Collio, Moraro, Mariano del Friuli, Corno di Rosazzo e San Giovanni al Natisone.

Nella zona cuscinetto saranno intensificati i controlli per contenere la diffusione dell'organismo.

