FVG_DIFESA Vite da vino 2026_V3													
Avversità	**Nome latino**	**Criteri di intervento: vincoli**	**Criteri di intervento: consigli**	**Sostanza attiva**	**S.a non sogg. alle limitazioni d'uso per avv.**	**Pieno campo**	**Coltura protetta**	**Gruppo chimico**	**Codice gruppo chimico**	**(1) n. max. interv. per singola s.a. indip. dall'avv.**	**(2) n. max. interv. per gruppo di s.a. indip. dall'avv.**	**Informazioni aggiuntive**	**Limitazioni d'uso e note**	**Limitazioni d'uso per avversità**
ESCORIOSI DELLA VITE	*Phomopsis sp.*		Interventi agronomici: - durante la potatura asportare le parti infette - non effettuare la trinciatura dei sarmenti o l'accantonamento degli stessi, ma raccoglierli e bruciarli. Interventi chimici: - vanno effettuati nelle seguenti fasi fenologiche: - inizio del germogliamento - dopo 8-12 giorni dal trattamento precedente.	***Prodotti rameici***	Si			Inorganici	M				28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura	
				Folpet				Ftalimmidi	M4		12		Massimo 12 trattamenti tra Folpet, Fluazinam e Dithianon.	
				Dithianon				Chinoni (antrachinoni)	M9					
				Azoxystrobin				Inibitori del chinone membra	C3		3		Massimo 3 tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin	
				Fosfonato di potassio				Fosfonati	P07		8		Solo in miscela con Dithianon.	
				Zolfo	SI			Inorganici	M					
PERONOSPORA DELLA VITE	*Plasmopara viticola*		Interventi chimici: Fino alla pre fioritura: - intervenire preventivamente sulla base della previsione delle piogge. Dalla pre fioritura alla allegazione: - anche in assenza di macchie d'olio intervenire cautelativamente con cadenze in base alle caratteristiche dei prodotti utilizzati. Successive fasi vegetative: - le strategie di controllo sono in relazione alla comparsa o meno della malattia e all'andamento climatico.	***Prodotti rameici***	Si			Inorganici	M				28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura.	
				Zolfo	Si			Inorganici	M				solo formulati in miscela con prodotti rameici	
				Cerevisane	Si									
				Olio essenziale di arancio	Si			Oli vegetali						
				Laminarina	Si			Composto naturale	P4					
				Fosetil alluminio				Fosfonati	P07		8		Massimo 8 interventi tra Fosfonati e Fosetil Al, escluso viti in allevamento.	
				Fosfonato di potassio				Fosfonati	P07					
				Fosfonato di disodio				Fosfonati	P07					
				Dithianon				Chinoni (antrachinoni)	M9		12		Massimo 12 tra Dithianon, Folpet e Fluazinam.	
				Folpet				Ftalimmidi	M4					
				Fluazinam				Disaccoppiante della fosforilazione ossidativa	C5					
				Cymoxanil				Acetammidi	27	3				
				Iprovalicarb				Ammidi dell'acido carbossilico-CAA	H5		4			
				Mandipropamid				Ammidi dell'acido carbossilico-CAA	H5					
				Valifenalate				Ammidi dell'acido carbossilico-CAA	H5					
				Zoxamide				Benzammidi	B3	2				
				Fluopicolide				Benzamidi	B5	2			Massimo 2 interventi tra Metalaxil e Fluopicolide	
				Ciazofamid				Inibitori del chinone membrana interna QiI	C4		3			
				Amisulbrom				Inibitori del chinone membrana interna QiI	C4					
				Ametoctradina				Inibitore del chinone sulla membrana esterna-QoSI	C8	3				
				Oxathiopiprolin				Inibizione della proteina omologa legante dell'ossisterolo	F9	1			Da usare in miscela con s.a. a diverso meccanismo d'azione.	
				Metalaxil-M				Fenilammidi	A1		3			
				Benalaxil-M				Fenilammidi	A1					
				Metalaxil				Fenilammidi	A1	2			Massimo 2 interventi tra Metalaxil e Fluopicolide	
				Prodotti rameici	Si			Inorganici	M				Solo formulati commerciali in miscela con zolfo;28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura.	
				Zolfo	Si			Inorganici	M					
				Ampelomyces quisqualis	Si			Microrganismi						
				Bacillus amyloliquefaciens	Si			Microbici Bacillus sp.	F6					
				COS-OGA	Si									
				Cerevisane	Si									
				Bacillus pumilus	Si			Microrganismi						
				Olio essenziale di arancio	Si			Oli vegetali						
				Bicarbonato di potassio	Si			Composti inorganici	NC	8				
				Laminarina	Si			Composto naturale	P4					
				Eugenolo	Si									
				Geraniolo	Si			Estratto vegetale	F7					
				Timolo	Si			Estratto vegetale	F7					
				Polisolfuro di calcio	Si			Composti inorganici	NC					

OIDIO DELLA VITE	*Uncinula necator*		Interventi chimici: - Zone ad alto rischio: Fino alla pre fioritura: - intervenire preventivamente con antioidici di copertura. Dalla pre fioritura all'invaiatura: - intervenire alternando prodotti sistemici e di copertura. - Zone a basso rischio: - intervenire cautelativamente nell'immediata pre-fioritura e proseguire gli interventi alternando prodotti sistemici e di copertura.	*Estratto acquoso semi germinato di Lupinus albus dolce.*	Si			Estratto vegetale						
				Bupirimate				Idrossi- (2-amino-) pirimidine	A2		2		Massimo 2 interventi tra Bupirimate, Proquinazid e Pyriofenone.	
				Trifloxystrobin				Inibitori del chinone membrana esterna QOI	C3		3			
				Azoxystrobin				Inibitori del chinone membrana esterna QOI	C3					
				Pyraclostrobin				Inibitori del chinone membrana esterna QOI	C3					
				Ciflufenamid				Fenil-acetammide	U06	2				
				Penconazolo				DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I	G1		3			
				Mefentrifluconazolo				DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I	G1					
				Tetraconazolo				DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I	G1					
				Difenoconazolo				DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I	G1	1			Massimo 1 intervento in alternativa tra Difenconazolo e Tebuconazolo	
				Tebuconazolo				DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I	G1	1				
				Proquinazid				Aza-naftaleni	E1		2		Massimo 2 interventi tra Bupirimate, Proquinazid e Pyriofenone.	
				Spiroxamina				Ammine - morfoline IBE-Classe II	G2	3				
				Metrafenone				Aril-fenil-chetone	U		3			
				Pyriofenone				Aril-fenil-chetone	U				Massimo 2 interventi tra Bupirimate, Proquinazid e Pyriofenone.	
				Meptildinocap				Disaccoppiante della fosforilazione ossidativa	C5	2				
				Boscalid				Inibitori Succinato deidrogenasi SDHI	C2	1	2			
				Fluxapyroxad				Inibitori Succinato deidrogenasi SDHI	C2					
MUFFA GRIGIA	*Botrytis cinerea*		Interventi agronomici: - scelta di idonee forme di allevamento - equilibrate concimazioni e irrigazioni - carichi produttivi equilibrati - potatura verde e sistemazione dei tralci - efficace protezione dalle altre avversità. Interventi chimici: Si consiglia di intervenire nelle seguenti fasi fenologiche: - invaiatura.	*Trichoderma asperellum*	Si			Microrganismi						Contro questa avversità al massimo 2 interventi all'anno con prodotti chimici di sintesi.
				Trichoderma gamsii	Si			Microrganismi						
				Aureobasidium pullulans	Si			Microrganismi						
				Pythium oligandrum	Si			Microrganismi						
				Bicarbonato di potassio	Si			Composti inorganici	NC	8				
				Bacillus amyloliquefaciens	Si			Microbici Bacillus sp.	F6	6			Registrato anche su marciume acido	
				Bacillus subtilis	Si			Microbici Bacillus sp.	F6	4			Consigliato in pre-raccolta anche con infezioni in atto, assicurando una buona bagnatura del grappolo	
				Trichoderma atroviride	Si			Microrganismi		4				
				Metschnikowia fructicola	Si					6				
				Saccharomyces cerevisiae	Si			Microrganismi		6				
				Eugenolo	Si					4				
				Geraniolo	Si					4				
				Timolo	Si					4				
				Cerevisane	Si									
				Laminarina	Si			Composto naturale	P3					
				Estratto acquoso semi germinato di Lupinus albus dolce.	Si			Estratto vegetale						
				Fluazinam				Disaccoppiante della fosforilazione ossidativa	C5		12		Massimo 12 interventi tra Dithianon, Folpet e Fluazinam.	
				Pyrimethanil				Anilinopirimidine	D1	1				
				Cyprodinil				Anilinopirimidine	D1	1	1		Massimo 1 intervento, da solo o in miscela con Fludioxonil	
				Fludioxonil				PP -fenilpirroli	E2	1			Massimo 1 intervento, da solo o in miscela con Cyprodinil	
				Fenexamid				IBE-Classe III	G3	2				
				Boscalid				Inibitori Succinato deidrogenasi SDHI	C2	1	2		Massimo 2 interventi con SDHI (Boscalid e Fluxapyroxad)	
				Isofetamid				Inibitori Succinato deidrogenasi SDHI	C2	1				
				Prodotti rameici	Si			Inorganici	M				28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura.	
				Zolfo	Si			Inorganici	M				Solo formulati commerciali in miscela con rameici	
				Fosfonato di potassio				Fosfonati	P07		8			

BLACK - ROT	*Guignardia bidwelli*		Interventi agronomici: - raccogliere e distruggere i grappoli infetti - asportare ed eliminare i residui di potatura. Interventi chimici: - intervenire su varietà e vigneti a rischio - privilegiare nella scelta dei fungicidi i prodotti efficaci anche su Black-rot.	Folpet				Ftalimmidi	M4		12		Massimo 12 trattamenti tra Folpet, Fluazinam e Dithianon.	
				Dithianon				Chinoni (antrachinoni)	M					
				Trifloxystrobin				Inibitori del chinone membrana esterna QOI	C3		3			
				Azoxystrobin				Inibitori del chinone membrana esterna QOI	C3					
				Penconazolo				DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I	G1		3		Massimo 1 intervento in alternativa tra Difenconazolo e Tebuconazolo.	
				Tetraconazolo				DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I	G1					
				Difenoconazolo				DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I	G1	1				
				Mefentrifluconazolo				DMI -inibitori di demetilazione- IBE Classe I	G1					
MAL DELL'ESCA	*Fomitiponia mediterranea; Phaeoacremonium aleophilum; Phaeomonniella chlamydospora*		Interventi agronomici: - in caso di piante fortemente attaccate procedere all'estirpazione e bruciature delle stesse - in caso di piante infette solo in parte, asportare le parti invase dal fungo, procedere alla loro bruciatura e allevare dal legno sano un nuovo germoglio, bruciatura e allevare dal legno sano un nuovo germoglio, previa disinfezione della superficie di taglio. previa disinfezione della superficie di taglio - segnare in estate le piante infette. Le stesse vanno potate separatamente dalle altre per limitare l'ulteriore diffusione della malattia. Gli attrezzi da taglio vanno disinfettati con sali quaternari di ammonio o ipoclorito di sodio.	*Trichoderma atroviride*	Si			Microrganismi						
				Trichoderma asperellum	Si			Microrganismi						
				Trichoderma gamsii	Si			Microrganismi						
				Boscalid				Inibitori Succinato deidrogenasi SDHI	C2				Formulati in miscela Boscalid + Pyraclostrobin è utilizzabile per trattamenti al bruno sui tagli di potatura. Non entra nel cumulo di SDHI e di QOI.	
				Pyraclostrobin				Inibitori del chinone membrana esterna QOI	C3				Formulati in miscela Boscalid + Pyraclostrobin è utilizzabile per trattamenti al bruno sui tagli di potatura. Non entra nel cumulo di SDHI e di QOI.	
MARCIUME DEGLI ACINI	*Penicillium spp., Aspergillus spp.*		Evitare ferite sugli acini da parte di altre avversità come l'oidio, la tignoletta, ecc.	Pyrimethanil				Anilinopirimidine	D1	1	2		Massimo 1 intervento, da solo o con formulati a base di Fludioxonil + Cyprodinil	
				Cyprodinil				Anilinopirimidine	D1	1				
				Fludioxonil				PP -fenilpirroli	E2	1				
MARCIUME ACIDO	*Batteri (Acetobacter); Lieviti (Candida spp Kloekera spp)*		E' favorito da lesioni degli acini.	*Cerevisane*	Si									
				Trichoderma asperellum	Si			Microrganismi						
				Trichoderma gamsii	Si			Microrganismi						
				Bacillus amyloliquefaciens	Si			Microbici Bacillus sp.	F6					
				Bacillus subtilis	Si			Microbici Bacillus sp.	F6					
				Pythium oligandrum	Si			Microrganismi						
FITOFAGI	**Durante la stagione vegetativa *sono ammessi al massimo 4 trattamenti con insetticidi chimici di sintesi ed un trattamento con acaricidi chimici di sintesi per ragnetto rosso e ragnetto giallo. I trattamenti con insetticidi chimici di sintesi possono essere aumentati a 5 all'anno solo nelle aree viticole in cui il trattamento contro la terza generazione delle tignole della vite venga indicato nei bollettini di difesa integrata pubblicati in regione FVG. Nei vigneti utilizzati come piante madri per marze sono ammessi due ulteriori interventi con insetticidi chimici di sintesi. Non sono ammesse miscele estemporanee, eccetto per gli acaricidi. Non sono considerati prodotti chimici di sintesi e, quindi, sono esclusi da questa limitazione: Olio minerale, Olio essenziale di arancio, Azadiractina, Piretrine pure, Beauveria bassiana, Bacillus thuringiensis, Sali potassici di acidi grassi, Spinosad, Zolfo.***													
TRIPIDI	*Franklinella ocidentalis; Drepanothrips reuteri*		Interventi chimici: - intervenire solo dopo aver rilevato sulla vegetazione una rilevante infestazione.	*Sali potassici di acidi grassi*	Si			Sali di potassio degli acidi grassi						
				Olio essenziale di arancio	Si			Oli vegetali						
				Beauveria bassiana	Si			Microrganismi						
				Azadiractina	Si			Prodotti naturali	UN					
				Paecilomyces fumosoroseus	Si			Microrganismi						
				Piretrine				Piretroidi e piretrine	3				Piretrine e Piretroidi possono influire negativamente sui fitoseidi. Max 2 interventi tra tutti i Piretroidi. Max 1 intervento in alternativa tra Lambda-cialotrina, Esfenvalerate, Etofenprox. Il terzo intervento del gruppo è vincolato all'impiego delle Piretrine.	Massimo 1 intervento all'anno
				Tau-fluvalinate				Piretroidi e piretrine	3	1	3			
				Etofenprox				Piretroidi e piretrine	3	1				
				Spinosad	Si			Spinosine	5		3			
								Butenoidi	4D	1				
NOTTUE	*Noctua fimbrata e altre*		Infestazioni occasionali alla ripresa vegetativa, con danni a carico di gemme e germogli erbacei, in particolare con inizi stagione caldi. Più frequente in aree collinari.	*Bacillus thuringiensis*	Si			Microrganismi						
			Interventi agronomici: - effettuare una scortecciatura e uno spazzolamento dei ceppi nelle zone dove inizia a manifestarsi l'infestazione. Interventi chimici: - intervenire solo sui ceppi infestati. Per la T. vitis il periodo più idoneo è alla fuoriuscita delle neanidi (maggio–giugno nelle zone	*Beauveria bassiana*	Si			Microrganismi						
				Olio bianco	Si			Oli minerali	NC					
				Azadiractina	Si			Prodotti naturali	UN					
				Confusione sessuale	Si									

COCCINIGLIE	*Planococcus spp.; Targionia vitis; Parthenolecanium corni; Neopulvinaria innumerabilis; Heliococcus bohemicus; Pseudococcus comstoki*		meridionali, metà giugno-metà luglio nelle zone settentrionali). Interventi di lotta biologica: Anagyrus pseudococci: - distribuire l'insetto a partire da fine aprile-maggio con dosaggi stagionali di 1500-2000 individui/ettaro in almeno 2 lanci differiti. Cryptolaemus montrouzieri: - distribuire l'insetto vicino ai focolai di infestazione delle cocciniglie, indicativamente 200-300 individui/ettaro. In caso di consistenti infestazioni, l'impiego di Anagyrus può essere ben abbinato a quello di Cryptolaemus. Distanziare opportunamente gli interventi insetticidi dai	*Maltodestrina*	Si			Prodotti naturali	UN					
				Cyantraniliprole					Diamidi	28		2	Massimo 1 intervento ogni 3 anni.	Registrato per il controllo di *Planococcus ficus* .	Contro questa avversità al massimo 2 intervento all'anno.
				Acetamiprid					Neonicotinoidi	4A	1				
				Pyriproxyfen					Ossipiridine	7C	1				
				Flupyradifurone					Butenoidi	4D	1				
TIGNOLETTA DELLA VITE	*Lobesia botrana*	Interventi chimici: - per la prima generazione antofaga non si effettua alcun trattamento - per la II e III generazione, il momento dell'intervento va determinato in relazione alla curva di volo registrato con le trappole a feromoni e al fitofarmaco scelto per il controllo e ove è disponbilie dall'andamento delle ovideposizioni rivelate con specifici rilievi e/modelli previsionali.		*Confusione sessuale*	Si										Massimo 1 intervento all'anno con prodotti chimici di sintesi.
				Bacillus thuringiensis	Si				Microrganismi						
				Azadiractina	Si				Prodotti naturali	UN					
				Spinosad					Spinosine	5	3				
				Tebufenozide					Diacilidrazine	18	2				
				Cyantraniliprole					Diamidi	28		2	Massimo 1 intervento ogni 3 anni.		
				Clorantraniliprole					Diamidi	28	1				
				Emamectina benzoato					Avermectine	6	2				
TIGNOLA DELLA VITE	*Clysia sp.*			*Confusione sessuale*	Si										
				Bacillus thuringiensis	Si				Microrganismi						
				Spinosad					Spinosine	5	3				
				Tebufenozide					Diacilidrazine	18	2				
				Clorantraniliprole					Diamidi	28		1			
				Emamectina benzoato					Avermectine	6	2				
EULIA	*Argyrotaenia sp.*	Non sono ammessi trattamenti specifici con insetticidi chimici di sintesi. Attenersi alle indicazioni dei tecnici dei Gruppi di difesa integrata.	Installare trappole a feromoni per la cattura degli adulti. Le infestazioni di questo tortricide vengono di norma controllate dai trattamenti insetticidi effettuati contro le tignole della vite.	*Bacillus thuringiensis*	Si				Microrganismi						
RAGNETTO ROSSO	*Panonychus ulmi; Tetranychus urticae*	Soglia di intervento: - inizio vegetazione: 60-70 % di foglie con forme mobili presenti - piena estate: 30-45 % di foglie con forme mobili presenti.	Interventi agronomici: - razionalizzare le pratiche colturali che predispongono a eccessivo vigore vegetativo.	*Sali potassici di acidi grassi*	Si				Sali di potassio degli acidi grassi						Al massimo 1 intervento acaricida all'anno con prodotti di sintesi, indipendentemente dall'avvesità. E' ammessa la miscela ovicida + adulticida.
				Beauveria bassiana	Si				Microrganismi						
				Maltodestrina	Si				Prodotti naturali	UN					
				Exitiazox					Tiazolidinoni	10A					
				Tebufenpirad					METI acaricidi ed insetticidi	21A	1				
				Fenpiroximate					METI acaricidi ed insetticidi	21A					
				Acequinocyl					Naftochinoni	20B					
RAGNETTO GIALLO DEI FRUTTIFERI	*Eotetranychus carpini*	Soglia di intervento: - inizio vegetazione: 60-70 % di foglie con forme mobili presenti - piena estate: 30-45 % di foglie con forme mobili presenti.	Interventi agronomici: - razionalizzare le pratiche colturali che predispongono a eccessivo vigore vegetativo.	*Sali potassici di acidi grassi*	Si				Sali di potassio degli acidi grassi						Al massimo 1 intervento acaricida all'anno con prodotti di sintesi, indipendentemente dall'avvesità. E' ammessa la miscela ovicida + adulticida.
				Maltodestrina	Si				Prodotti naturali	UN					
				Exitiazox					Tiazolidinoni	10A					
				Tebufenpirad					METI acaricidi ed insetticidi	21A	1				
				Fenpiroximate					METI acaricidi ed insetticidi	21A					
ACARI ERIOFIDI	*Calepitrimerus vitis, Eriophyes erineus*		Interventi chimici: - intervenire solo in caso di forte attacco - all'inizio della ripresa vegetativa se si è verificata la presenza nella annata precedente - in caso di accertata presenza sulle foglie per evitare danni sui grappoli.	*Zolfo*	Si				Inorganici	M					Al massimo 1 intervento acaricida all'anno con prodotti di sintesi, indipendentemente dall'avvesità.
				Olio minerale	Si				Oli minerali	NC					
				Sali potassici di acidi grassi	Si				Sali di potassio degli acidi grassi						
				Maltodestrina	Si				Prodotti naturali	UN					
				Tebufenpirad					METI acaricidi ed insetticidi	21A	1				
SCAFOIDEO	*Scaphoideus titanus*	Interventi insetticidi: La difesa contro questa cicalina deve essere effettuata seguendo scrupolosamente le indicazioni del SFR; Nei vigneti di PMM seguire le indicazioni dell'SFR; Porre attenzione al rispetto degli impollinatori.		*Sali potassici di acidi grassi*	Si				Sali di potassio degli acidi grassi					Efficacia limitata alle forme giovanili (fino alla II e III età)	
				Beauveria bassiana	Si				Microrganismi						
				Olio essenziale di arancio dolce	Si				Oli vegetali						
				Azadiractina	Si				Prodotti naturali	UN					
				Maltodestrina	Si				Prodotti naturali	UN					
				Acetamiprid					Neonicotinoidi	4A	1				
				Flupyradifurone					Butenoidi	4D	1				
				Tau-fluvalinate					Piretroidi e piretrine	3A	2				
				Deltametrina					Piretroidi e piretrine	3A	2				
				Lambda-cialotrina					Piretroidi e piretrine	3A	1				
				Etofenprox					Piretroidi e piretrine	3A	1	3		Piretrine e Piretroidi possono influire negativamente sui fitoseidi. Max 2 interventi tra tutti i Piretroidi. Max 1 intervento in alternativa tra Lambda-cialotrina,	

				Esfenvalerate				Piretroidi e piretrine	3A	1			Esfenvalerate, Etofenprox. Il terzo intervento del gruppo è vincolato all'impiego delle Piretrine.	
				Piretrine				Piretroidi e piretrine	3A					
ALTRE CICALINE	*Empoasca vitis, Zygina rhamni, Erasmoneura vulnerata*			*Olio essenziale di arancio dolce*	Si			Oli vegetali						Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno
				Sali potassici di acidi grassi	Si			Sali di potassio degli acidi grassi						
				Azadiractina	Si			Prodotti naturali	UN					
				Beauveria bassiana	Si			Microrganismi						
				Olio minerale	Si			Oli minerali	NC					
				Cyantraniliprole				Diamidi	28		2	Massimo 1 intervento ogni 3 anni.	Registrato per il controllo di *Empoasca vitis* .	
				Acetamiprid				Neonicotinoidi	4A	1				
				Flupyradifurone				Butenoidi	4D	1			Autorizzato su Empoasca	
				Piretrine				Piretroidi e piretrine	3A	3	3		Piretrine e Piretroidi possono influire negativamente sui fitoseidi. Max 2 interventi tra tutti i Piretroidi. Max 1 intervento in alternativa tra Lambda-cialotrina, Esfenvalerate, Etofenprox. Il terzo intervento del gruppo è vincolato all'impiego delle Piretrine.	
				Tau-fluvalinate				Piretroidi e piretrine	3A	2				
				Etofenprox				Piretroidi e piretrine	3A	1				
				Esfenvalerate				Piretroidi e piretrine	3A	1				
FILLOSSERA DELLA VITE	*Viteus vitifoliae*			Acetamiprid				Neonicotinoidi	4A	1				
				Flupyradifurone				Butenoidi	4D	1				
RODITORI				Fosfuro di zinco										