

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,
RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA**

**MONITORAGGIO *Halyomorpha halys*
Aggiornamento del 18 agosto 2026**

Il Servizio Fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA è attivo con uno specifico **monitoraggio della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*)** sul territorio regionale dal 2014. Nel corso della stagione 2026, oltre alle osservazioni visive effettuate nelle principali colture e siepi per valutare la presenza di questo pentatomide e dei suoi antagonisti, prosegue l'attività di monitoraggio passivo con le trappole Rescue® con feromoni di aggregazione Trécé, collocate su siepi limitrofe a differenti colture. Lo scopo di questo monitoraggio consiste nel rilevare la distribuzione delle popolazioni (individui adulti e giovani) sul territorio regionale da inizio aprile sino a fine estate.

Situazione generale

Nelle ultime due settimane si è osservato un generalizzato aumento delle catture di adulti, ma anche di stadi giovanili di *Halyomorpha halys* nelle trappole. L'incremento maggiore è stato rilevato nella zona di Latisana, dove sono stati riscontrati danni alle pere (Foto 1) durante la fase della raccolta nonostante durante i monitoraggi visivi non si fosse manifestata la presenza negli impianti; in qualche caso, da questa settimana, si comincia ad osservare la presenza di cimici anche nei filari di bordo e in testata di alcuni meleti (Foto 2). In alcuni appezzamenti di soia, limitrofi a meleti, sono state osservate ovature di *H. halys* e forme giovanili (Foto 3). Negli altri areali per il momento non si riscontrano danni su mele e pere.


Nel corso dei rilievi visivi sono stati osservati adulti in accoppiamento e presenza di ovature, in qualche caso parassitizzate (foto 4).

In questa fase della stagione è importante proseguire il monitoraggio delle colture soprattutto nelle aree di bordo senza però tralasciare l'interno degli impianti.

Per tutte le colture si consiglia di effettuare monitoraggi visivi nei propri impianti per valutare la situazione e intervenire tempestivamente.

Si raccomanda di consultare i bollettini di difesa integrata per le diverse colture per approfondimenti specifici e per le eventuali strategie di difesa.

Monitoraggio territoriale *Halyomorpha halys*: catture totali di giovani e adulti rilevate nelle trappole posizionate il 1° aprile. **Rilievi effettuati dal 10 al 14 agosto.**



Monitoraggio territoriale *Halyomorpha halys*: catture settimanali e catture cumulate dal 1° aprile. Rilievi effettuati dal 10 a 14 agosto.

ID mappa	Comune	Contesto colturale	Adulti	Giovani	Totale settimanale (giovani+adulti)	Totale dal 1° aprile (giovani+adulti)
1	Buja	melo	127	30	157	673
2	Campolongo Tapogliano	pesco	2	0	2	135
3	Caneva	olivo	-	-	-	900
4	Chiopris-Viscone	melo	-	-	-	77
5	Cividale del Friuli	olivo	-	-	-	258
6	Codroipo	siepe-pero	58	88	146	840
7	Codroipo	siepe-vite- mais	28	78	106	347
8	Fiumicello Villa Vicentina	pesco	15	0	15	431
9	Fiumicello Villa Vicentina	pesco	8	0	8	15
10	Latisana	soia-pero	109	7	116	641
11	Latisana	pero-pesco	105	2	107	332
12	Latisana	siepe	115	1	116	673
13	Latisana	siepe-pero	0	0	0	6
14	Magnano in Riviera	siepe	89	22	111	989
15	Maniago	melo	16	18	34	511
16	Mortegliano	melo	20	9	29	104
17	Moruzzo	olivo	-	-	0	755
18	Muggia	olivo	0	5	5	87
19	Pozzuolo del Friuli	sito di svernamento	10	18	28	587
20	Pulfero	melo	-	-	-	38
21	Rivignano Teor	melo	-	-	-	19
22	Ronchi dei Legionari	olivo	0	0	0	70
23	San Dorligo della Valle	olivo	0	0	0	93
24	San Quirino	melo	0	0	0	8
25	San Quirino	nocciolo	-	-	0	43
26	San Quirino	melo	52	12	64	533
27	San Quirino	melo	51	72	123	569
28	San Vito al Tagliamento	melo	25	8	33	312
29	Sedegliano	kiwi-melo	120	29	149	1986
30	Sequals	siepe	2	5	7	13
31	Spilimbergo	melo	43	3	46	400
32	Valvasone Arzene	vite	16	16	32	283
33	Valvasone Arzene	melo	0	1	1	9




Foto 1 - Punture di *H. halys* su pero.




Foto 2 - Punture di *H. halys* su melo.



Foto 3 – Ovatura di *H. halys* e forme giovanili su soia.



Foto 4 - ovatura di *H. halys* parassitizzata da *Trissolcus* spp. su actinidia; evidenziato un adulto del parassitoide.

Le catture della cimice marmorata asiatica, come quelle di altri insetti dannosi delle principali coltivazioni presenti in regione, sono consultabili sulla **piattaforma "AgriCS, Agricoltura, Conoscenza, Sviluppo"** progetto realizzato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e finanziato dalla sottomisura 1.2 del Programma di Sviluppo Rurale FVG 2014-2020. Dal link diretto <https://agrics.regione.fvg.it/agricsweb/fito> si può accedere alle sezioni **"Monitoraggio della cimice marmorata asiatica"** e **"Monitoraggio altri insetti dannosi"**. Nella **sezione cimice** sono aggiornate in tempo reale le catture settimanali di adulti e giovani in ciascun sito monitorato. Sono presenti **diversi link**:

- **Mappa** in cui è possibile cliccare su ciascuno dei siti monitorati per visualizzare il grafico delle catture settimanali
- **Andamento regionale** in cui è rappresentato il grafico delle catture medie settimanali di adulti e giovani di tutti i siti monitorati, che dà un'idea di massima della situazione sul territorio.
- **Serie storiche** singoli siti monitorati dal 2021 al 2025
- **Serie storiche andamenti regionali** dal 2021 al 2025