

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO,
RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA**

**MONITORAGGIO *Halyomorpha halys*
Aggiornamento del 1° ottobre 2026**

Il Servizio Fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA è attivo con uno specifico **monitoraggio della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*)** sul territorio regionale dal 2014. Nel corso della stagione 2026, oltre alle osservazioni visive effettuate nelle principali colture e siepi per valutare la presenza di questo pentatomide e dei suoi antagonisti, prosegue l'attività di monitoraggio passivo con le trappole Rescue® con feromoni di aggregazione Trécé, collocate su siepi limitrofe a differenti colture. Lo scopo di questo monitoraggio consiste nel rilevare la distribuzione delle popolazioni (individui adulti e giovani) sul territorio regionale da inizio aprile sino a fine estate.

Situazione generale

In questa fase le catture rilevate nelle trappole evidenziano un incremento degli adulti, mentre quelle riferibili agli stadi giovanili risultano ormai sporadiche o assenti. Le neanidi e le ninfe residue stanno completando il loro sviluppo verso lo stadio adulto, che rappresenta la forma destinata a svernare nei pressi di magazzini, capannoni, abitazioni, ecc...

Poiché la maggior parte delle specie e varietà di fruttiferi sono già state raccolte, gli adulti potrebbero concentrarsi ad esempio su actinidia e varietà tardive di mele, per cui si consiglia di effettuare monitoraggi visivi nei propri impianti per valutare la situazione nelle settimane che precedono la raccolta.

Si raccomanda di consultare i bollettini di difesa integrata per le colture specifiche per approfondimenti specifici e per le eventuali strategie di difesa.


Monitoraggio territoriale *Halyomorpha halys*: catture settimanali e catture cumulate dal 1° aprile. Rilievi effettuati dal 28 settembre al 1° ottobre.

ID mappa	Comune	Contesto culturale	Adulti	Giovani	Totale settimanale (giovani+adulti)	Totale dal 1° aprile (giovani+adulti)
1	Buja	melo	66	5	71	1352
2	Campolongo Tapogliano	pesco	fine rilievi 9 settembre			142
3	Caneva	olivo	-	-	-	1052
4	Chiopris-Viscone	melo	fine rilievi 16 settembre			373
5	Cividale del Friuli	olivo	-	-	-	362
6	Codroipo	siepe-pero	122	27	149	1616
7	Codroipo	siepe-vite-mais	95	9	104	960
8	Fiumicello Villa Vicentina	pesco	fine rilievi 9 settembre			563
9	Fiumicello Villa Vicentina	pesco	fine rilievi 9 settembre			71
10	Latisana	soia-pero	39	7	46	1009
11	Latisana	pero-pesco	4	1	5	710
12	Latisana	siepe	32	0	32	1060
13	Latisana	siepe-pero	0	0	0	6
14	Magnano in Riviera	siepe	88	5	93	1467
15	Maniago	melo	43	16	59	676
16	Mortegliano	melo	36	2	38	222
17	Moruzzo	olivo	-	-	-	1149
18	Muggia	olivo	-	-	-	220
19	Pozzuolo del Friuli	sito di svernamento	53	0	53	919
20	Pulfero	melo	fine rilievi 16 settembre			38
21	Rivignano Teor	melo	fine rilievi 16 settembre			29
22	Ronchi dei Legionari	olivo	-	-	-	223
23	San Dorligo della Valle	olivo	-	-	-	199
24	San Quirino	melo	6	0	6	17
25	San Quirino	nocciolo	-	-	-	50
26	San Quirino	melo	58	4	62	1061
27	San Quirino	melo	26	0	26	922
28	San Vito al Tagliamento	melo	25	11	36	774
29	Sedegliano	kiwi-melo	110	10	120	3070
30	Sequals	siepe	22	0	22	36
31	Spilimbergo	melo	20	15	35	647
32	Valvasone Arzene	vite	183	7	200	658
33	Valvasone Arzene	melo	0	0	0	11

Confronto catture negli anni 2025 e 2026 e paragone con uno degli anni in cui si sono registrate le catture più elevate in Friuli Venezia Giulia

Una prima analisi dei dati evidenzia come nel 2026 i livelli di popolazione siano risultati superiori rispetto a quelli osservati nel 2025, come mostrato dalle mappe sottostanti relative alle catture cumulative registrate dal 1° aprile al 30 settembre. Tuttavia, il confronto con il quadro rilevato nel 2019 (mappa di maggiori dimensioni) conferma che le popolazioni osservate negli ultimi anni si mantengono su livelli, comunque nettamente inferiori rispetto a quelli registrati nel periodo antecedente al 2020.

Monitoraggio territoriale *Halyomorpha halys*: confronto delle catture totali di giovani e adulti rilevate nelle trappole dal 1° aprile al 30 settembre nel 2025 e nel 2026 e nel 2019 (anno rappresentativo del periodo con le catture più elevate in FVG).



Le catture della cimice marmorata asiatica, come quelle di altri insetti dannosi delle principali coltivazioni presenti in regione, sono consultabili sulla **piattaforma "AgriCS, Agricoltura, Conoscenza, Sviluppo"** progetto realizzato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e finanziato dalla sottomisura 1.2 del Programma di Sviluppo Rurale FVG 2014-2020. Dal link diretto <https://agrics.regione.fvg.it/agricsweb/fito> si può accedere alle sezioni "**Monitoraggio della cimice marmorata asiatica**" e "Monitoraggio altri insetti dannosi". Nella **sezione cimice** sono aggiornate in tempo reale le catture settimanali di adulti e giovani in ciascun sito monitorato. Sono presenti **diversi link**:

- **Mappa** in cui è possibile cliccare su ciascuno dei siti monitorati per visualizzare il grafico delle catture settimanali
- **Andamento regionale** in cui è rappresentato il grafico delle catture medie settimanali di adulti e giovani di tutti i siti monitorati, che dà un'idea di massima della situazione sul territorio.
- **Serie storiche** singoli siti monitorati dal 2021 al 2025
- **Serie storiche andamenti regionali** dal 2021 al 2025